

H30岩船米生育速報(7月30日現在)

コシヒカリの生育概況

村上農業普及指導センター

草丈：やや長 莖数：並 葉色：やや淡～淡 出穂期予想：並
 ○分施肥体系で穂肥施用等により、葉色がやや回復したほ場もあるが、週末は強風の影響等で穂肥施用が遅れ、葉色が指標値に比べ淡いほ場も多い。
 ○基肥一発肥料を施用したほ場では葉色が低下し、指標値に比べ淡いほ場も多い。(一部で葉色が大きく低下しているほ場も散見される。)

当面の管理のポイント

○後期栄養を確保し、登熟を向上させるため、**2回目穂肥はしっかりと確実に施用しましょう。**
 ①2回目の穂肥を実施したほ場でも、葉色の上昇が見られなかったり、上昇してもまたすぐに葉色の低下が見られる場合や、②基肥一発肥料のほ場で、葉色が大きく低下して、出穂期の葉色が他のほ場より淡くなると予想される場合は、**出穂3日前(走り穂が見られる頃)までに、追肥(チッソ成分で1kg/10a以内)を行いましょう。**
 なお、JA米は化学由来窒素量の上限があるので、JAに相談してください。
 ○飽水管理を徹底し、ほ場表面が常に濡れているよう水を切らさないようにしましょう。
 なお、気象予報等に十分注意して、異常気象が予想される場合は、事前に十分に湛水するなどの対応をしてください。

【コシヒカリ】(*印は基肥一発肥料)

調査場所	田植日	草丈 (cm, %)			莖数 (本/m ² , %)			葉数 (葉)			葉色 (SPAD値)			調査ほ場の予想出穂期
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差	
山北* (大毎)	5/12	89	105%	105%	375	99%	106%	12.2	0.0	0.4	31.1	-2.4	2.0	8月11日
朝日 (川端)	5/15	88	102%	109%	432	111%	113%	13.3	-0.5	0.2	25.9	-6.1	-6.9	8月8日
村上* (山辺里)	5/16	87	102%	99%	275	70%	67%	13.2	0.5	-0.1	32.6	-0.4	-1.0	8月7日
神林 (牛屋)	5/10	90	111%	101%	353	98%	95%	13.1	0.9	0.1	30.8	-2.7	-3.2	8月6日
荒川 (名割)	5/12	87	101%	97%	355	93%	107%	13.1	0.6	0.2	31.0	-2.0	-4.5	8月13日
関川 (下関)	5/12	96	113%	110%	444	117%	115%	13.3	0.6	0.5	30.4	-3.1	-3.1	8月13日
平均	5/12	90	106%	102%	380	100%	106%	13.2	0.4	0.2	29.7	-3.2	-3.9	8月9日

○平均は6地点の、水稻作付面積に応じた加重平均

☆分施肥体系でコシヒカリ2回目穂肥が未施用の方は、確実に実施してください! ☆

問い合わせ先: 村上農業普及指導センター
 TEL : 0254-52-7930 E-mail : ngt111240@pref.niigata.lg.jp